

Lu 1^o 2^o 6.

35

N^o 35.

Observations Sur plusieurs grands abcès
dans le voisinage du fondement avec des
Réflexions Sur leur méthode Curative

Par M. Berdolin

Les mémoires, et observations Communiquée à
l'Académie par messieurs Joubert. et Jaget. Sur Les
moïens Curatif des grands abcès qui arrivent
dans le voisinage du fondement, mon paru
d'après l'assemblée des ~~principes~~ ^{principes} énoncés, qu'il étoit
difficile de fixer La Règle de Conduite que l'on
doit tenir pour La Curation de Cette maladie; En
Effet, Le chirurgien qui voudra prendre pour guide,
Les observations contenues dans Le premier et troisi.
volumes des mémoires de L'Académie qui traitent
Cette matière, Sera indéterminé sur La manière de
Les opérer, il seroit dont à désirer que dans une
maladie qui arrive si communément, il y ait un
assemblage des faits relatifs, afin que l'on puisse en
tirer des dogmes assurés pour La pratique, et je
serois très satisfait si mes observations, et mes réflexions
peuvent Contribuer à cet avantage.

1^{re} observation

un m^r. Sellier rue des vieux augustins eut il y a
quelques années, un abcès fort considérable ala
cuisse gauche près l'anus. Survenu à La suite d'une
forte contusion ^{sur} Cette partie, pour laquelle maladie

ARC 56 n^o 35



je saigné dans le commencement plusieurs fois le
malade. il fut aussi employé pour topique des médicaments
toniques propres à déterminer la résolution, malgré
ces différents ^{moins} il se forma un abcès. que j'ouvris
Lors que je juge de l'existence de la matière
purulente, je donnai à l'incision l'étendue
d'environ deux pouces, après l'évacuation du pus
je portai mon doigt dans l'abcès, et je trouvai le
rectum dénué de graisse dans une assez grande
surface sans apparence de crévasse ou orifice à cet
intestin, le foye avoit une étendue fort considérable
malgré cet état. je ne jugeai point devoir inciser
le rectum, mais je fis une incision à la partie
declive pour servir de gouttière à la matière
purulente, et coupai une partie des angles faits par
cette dernière incision, le pansement fut rien de
particulier de la méthode ordinaire. non plus que
les suivants. et le malade fut guéri le vingt huitième jour.

Reflexions

il résulte de cette observation que cet abcès doit être
considéré comme un plegmon simple. et que malgré la
dénudation de l'intestin rectum il n'avoit nulle
nécessité de l'inciser. D'autant que j'étois persuadé par
plusieurs autres faits semblables, que la réunion des
parties dilacérées se fait dans cette partie lors qu'il
n'y a point de fistule au rectum. ou à l'uretère, ou
carie aux os voisins, comme elle se fait pour

La guérison des abcès ~~de fondement~~ qui arrivent à
d'autres parties du Corps humain, dont les membranes
ont servi de planche à la matière purulente, et
que le précepte donné sur ce point de pratique
dans le premier volume des mémoires de
l'Académie page 391 sur l'ouverture des abcès du
fondement, ne doit être suivi aussi généralement
que l'auteur le prescrit; en disant que dans tous
les cas où il se forme un abcès dans le voisinage
du fondement il est nécessaire si l'abcès s'étend
un peu dans les graisses, et si l'intestin est découvert
d'ouvrir le rectum jusqu'au fond comme si l'on
faisoit l'opération de la fistule, et que sans cette
précaution il se fait de nouvelles collections de
matières et la plaie ne peut manquer de devenir
fistuleuse; Cet énoncé de l'auteur établit donc un
principe général d'ouvrir le Rectum toute les fois
qu'il se forme un abcès considérable à cette partie et que
l'intestin est dénué de graisse, l'auteur pose
ensuite pour principe de sa doctrine que la régénéra-
tion des chairs se fait difficilement à la surface de
tout intestin dépourvu de ses graisses, et dans cette
circonstance le pus séjourne dit il entre le rectum
et les graisses sans que la matière puisse être
expulsee par le rapprochem^t de ses parties, Ce qui

Sera un obstacle a la reunion, et Le Seul moyen de surmonter
cet inconuenient (continue l'auteur) Est d'ouvrir
Le rectum et de Couper le trousseau des fibres
Circulaires jusques au fond de l'abscess, —

D'après Cet Exposé, ne pourroit on pas Conclure que
Cette doctrine établie aussi généralement? Et Contraire à
nombre des faits qui reclament Contre, je viens en
donner l'exemple dans la précédente observation. et
monsieur Foubert avant moi dans son memoire Contenu
dans le troixiesme volume des memoires de l'Académie sur
Les abscess du fondement. a discuté Ce point de Doctrine
par des raisons et des succès multiplies, mais m.^r
Foubert en discutant Ce point de Doctrine établi par
m.^r Fayet ne til pas lui même donné pour raigle
trop générale de S'en tenir a La Simple ouverture
des abscess du fondement, raigle qui me paroît
devoir. auoir Ses Exceptions, monsieur Foubert après
auoir établi La theorie sur Les Causes de Ces especes
d'abscess. et auoir cité nombre d'observations qui
L'autorisent a Suivre Les procédés que Ses reflexions et Son
Experience lui en suggeré: Conclud quil seroit beaucoup
plus a propos de S'en tenir d'abord a La Simple ouverture
de l'abscess p.^r procurer L'évacuation du pus et que Le
Seul inconuenient qui en puisse resulter C'est
quil pourra rester une fistule, il Conuient
cependant quil seroit auantageux de pouruoir
opérer de façon que Le malade ne restat point

Exposé à une Seconde opération

On voit d'après Les mémoires et observations
de Ces deux praticiens que Leurs procédés sont
différents pour La Curation des grands abcès
qui arrivent dans Le voisinage du fondement
En Établissant, L'un pour principe, de faire de
grandes ouvertures, et fendant L'intestin rectum
toute Les fois qu'il se trouvera venue de graisse
L'autre au contraire, prescrit une simple ouverture
à la partie declive, pour procurer L'évacuation
des matières purulentes, et que dans Le cas, ou
cet abcès resteroit fistuleux, que Le traitement
en deviendra alors simple et sans danger, au
Lieu qu'on auroit fait une opération fort grave,
(continue mons^r. Joubert) En fendant L'intestin
Lors de L'ouverture de L'abcès, sur tout si Cette
incision ne comprend pas Le trou fistuleux dans
son trajet

voici présentement Les Circonstances particulières
ou il me paraît convenir d'apprécier Les Cas, ou Le
chirurgien doit se déterminer à faire une grande
ouverture à Ces espèces d'abcès, et fendre En
même temps L'intestin rectum, Cellui ou il
paroît convenir de se tenir à La simple ouverture
et Cellui ou il paroît convenir de faire de grandes
ouvertures sans fendre L'intestin rectum, mais
avant de ~~conclure~~^{sur} ce point de doctrine je vais
rapporter quelques observations relatives à Ce Sujet,



Seconde observation

Le Cuispinier de monsieur De Nantoüillet ancien
fermier général, eut il y a quelques années un abcès
fort Considerable ala fesse pres La marge de l'anus
survenu ala suite d'un plegmon, pour lequel
j'avois employé Les saignée, et topiques propres
à combattre l'inflammation, et l'engorgement de
La partie tumescée, malgré tous ces moïens
L'abcès se forma, et j'en fis l'ouverture en
suivant Les mêmes procedés dans La maniere
de prier, Comme j'avois fait au malade qui a
fait Le Sujet de la premiere observation, mais
après dix à douze jours de pissement je
distingué un point dans Le Centre de L'abcès
et du Côté du Rectum, qui ne se Regeneroit
que par Les chairs molles. La Supuration
étoit devenue Sereuse. je trempé pour lors
un Cordonnet dans Le beaume vert que
j'appliqué sur Cette partie, mais après trois
à quatre jours de L'usage de Ce medicament
Les choses me parurent a peu pres dans Le
même état, tandis que Les chairs de La
Circonference paroïsoit s'écroître, je me decidé
pour lors a faire une plus Exacte recherche
pour juger sil n'auoit point forifié ou Creusé
au Rectum pour Cet effet je porte un doigt dans Le fondement

et de l'autre main tenant un Stilet je le porte
dans le Centre de ses mauvaises chairs, et
après quelques recherches. je trouve l'orifice
ou Crevasse qui Communiquoit dans le rectum,
je porte alors une sonde cannelée dans cet orifice
dont je fis sortir l'extrémité par l'anus, et à la
faueur de la Cannelure je fis avec le bistouri
une incision depuis la perforation jusques
au dehors, Cella fait je porte une tente dans le
Rectum trempée dans le digestif ordinaire,
Les pansements suivans furent continués
de même jusques vers les derniers temps
que je ne pensai plus qu'avec le vin mielle
qui termina la guérison le trente sept^e jour

Reflexions

Cette observation prouve que malgré l'examen
que j'avois fait après l'ouverture de l'abcès
pour Connaître s'il n'avoit point d'orifice ou
Crevasse au rectum, il y en avoit une dont la
petitesse avoit échappé à la recherche que j'en
avois d'abord fait, j'ajouterai de plus que si
jeusse fendu le rectum dans le premier
temps de l'opération il seroit peutêtre arrivé
comme le dit monsieur Foubert que le petit
orifice ou Crevasse auroit peu netre point
compris dans l'incision, et alors le succès
de l'opération se ueroit douteux, j'ajouterai encore



a Cette reflexion, L'avantage que je retiré de
L'étendue de la premiere incision, puis quelle
me mis a portée de distinguer le vice Local
et d'employer le moyen Convenable a Le détruire
Ce que je n'aurois peu faire par une petite incision

Troisi^e observation

un domestique de feu monsieur de Trudaine Evêque
de Sens en eut il y a quelques années un abcès
fort Considerable près la marge de l'anus
survenu a la suite d'une arête de Morue quil
avoit avalé, et qui s'arrêta en travers dans le
rectum, que je tiré non sans difficulté par
le moyen d'une forte pince, mais L'irritation
qui fut déterminée par le Corps Etranger,
peut être même la perforation de l'intestin
donnerent lieu au dépôt dont il est question,
je n'en fis l'ouverture En suivant Les mêmes
procédés Comme dans Les deux observations
précédentes, mais Comme je presumai que
le Corps étranger pouvoit avoir perforé
l'intestin et donné lieu au dépôt, Cella me
determina a faire une Exakte recherche pour
decouvrir sil y avoit un orifice de Communication
du foye. a l'intérieur de l'intestin, mes recherches
ne furent point inutiles, et je trouvai En effet
au moyen d'un Stillet, un petit trou, a la faveur
duquel je portai une Sonde Canellée. Sur Laquelle

je glissai un bistouri. et fendis le Rectum depuis
La perforation jusqu'au dehors, je pensai le
malade comme le précédent qui fut parfaitement
guéri le trente deux^e jour

quatrième observation

un garçon du Bureau de l'Hotel des fermes
généralles. eut un abcès fort considérable il y a
quelques années ala fesse près la marge de
Lanus, Survenu a la suite d'un plegmon
pour lequel Les saignée et Cataplasmes
convenables furent employés, malgré ces
moiens il se termina par suppuration, Le jour
pris pour en faire l'ouverture monsieur
andouille fut prie d'assister, étant arrivés
tous les deux chez le malade, il nous dit que
son abcès étoit percé dans la nuit, En effet
après avoir levé l'appareil nous vîmes beaucoup
beaucoup de pus sur le Cataplasme et sur le
linge, mais ayant examiné la tumeur nous
n'aperçûmes aucune ouverture extérieure,
mais en la pressant un peu nous vîmes
sortir du pus par le fondement, Ce qui nous
donna la certitude de la Crevasse dans le
rectum, mais comme il nous parut par le
volume de la tumeur qu'il restoit encore beaucoup



de matière dans le foie, nous auris se deueniront pour
y donner jour par une ouverture extérieure. En
faisant une incision d'environ deux pouces,
après l'evacuation du pus je porte un doigt dans
l'un et de l'autre main tenant une sonde
canellée je la porte dans la Crevasse faite
au rectum, et son extrémité sortie au dehors
je fis une incision sur la Canellure en faisant
cet intestin dans toute sa longueur. C'est à dire
depuis la Crevasse jusqu'au dehors, je suivis
les mêmes procédés pour les pansement qu'aux
malades qui ~~font~~ ^{font} le sujet des précédentes observations,
et fut guéri au bout de six semaines malgré
un deuouement qui dura plusieurs jours

Reflexions

Cette observation semble ne présenter rien
de particulier. Cependant elle m'a fourni
encore de Reflexions relatives aux deux
memoires de messieurs Goubert et Jaget
sur l'ouverture des abscesses du fondement. et
voici en quoi elles consistent, premièrement
à Confirmer l'utilité de fendre l'intestin
rectum toute les fois que le lieu de l'orifice
est connu, Secondement à donner une
étendue suffisante à l'incision dans certains
cas particuliers, et que si je ne sçis fait qu'une petite

incision aux trois malades qui font le sujet
des trois dernières observations ils ne servit
guérir qu'avec beaucoup de difficulté et
vraisemblablement. il auroit ^{résulté} que l'abcès servit
resté fistuleux, ce qui auroit exigé pour leur
guérison un traitement particulier,

d'après toutes ces réflexions, je pense que
les grandes ouvertures sont préférables
aux petites pour la guérison des grands abcès
qui arrivent dans le voisinage du fondement,
En supposant; que ces espèces d'abcès arrivent
à un sujet d'un bon tempérament, et que
dans le cas du contraire, ou circonstances
particulières, comme à une femme sur la
fin d'une grossesse, ou à un sujet épuisé par
une longue maladie, ou affecté de quelque
vice particulier dans les liqueurs, les petites
ouvertures sont préférables aux grandes
je suis sur ce point de doctrine d'accord avec
M^r Foubert. Dussent elles rester fistuleuses,
attendu que dans ces cas particuliers, il pourroit
en résulter des accidents plus graves, en faisant
une incision plus étendue, sur tout si l'on
étoit obligé par la complication de l'abcès



de fendre ou inciser le Rectum, j'ajouterai
à ses reflexions que dans le Cas ou l'abcès
resteroit fistuleux La plus part de ces maladies
deviendront aisée à guerir par La méthode
que monieur Foubert a remise au jour et
perfectionnée, j'en puis rendre un temoignage
avantageux par Le Succès que j'ai vu. Sur
un malade de Ma Connaissance qui a guerir
par La Ligature avec Le plom, d'une fistule
Complète. et très ancienne En quatorze jours,
j'en ay guerir aussi. de très anciennes. et
Complètes. En suivant Les mêmes procedés

j'ai taché dans Le Cours de Le memoire de
distinguer Les Cas. ou Le chirurgien doit se
Déterminer à faire une grande. ou petite
ouverture. suivant Les Circonstances qui
accompagnent ou precedent Les abcès du
fondement, j'ai vu dans plusieurs Cas, des
grands abcès à Cette partie guerir par une
simple et petite ouverture, même plusieurs
ont esté gueris L'ouverture se tant faite
naturellement, mais Ces Cas particuliers
doivent jh décider Le chirurgien à se tenir
à Cette simple incision Lors que Le Sujet En a

bon temperam^t et quil nia aucun Symptome
fâcheux qui suppose a Letendüe que Lon peut Lui
donner. afin de Reconnaître plus aisement
sil nia point d'altération du Costé de l'intestin ou
fistule a l'uretre, ou Parie aux os voisins, et
deüiter par la une seconde opération qui
deüient Souuent plus Compliquée, je me
rapelle a Ce Suiet un fait Semblable arriué
a un de nos Confreres a qui il survint un
abcès au fondement quil ouurit Lui même
par une petite incision, apres Lévacuation
du pus il se pensa Simplem^t avec un emplatre
onguent de la mere, et Continua toujours Les
même traitemens; Six semaines ou deux mois
apres il me dit être guéri, mais peu de temps
apres sa poitrine s'affecta, la fièvre survint et
il tomba dans Le marasme, Son abcès dont
il disoit être guéri ne L'estoit pas, puis que vers
Le dernier temps de sa vie il nous fit prier
messieurs andouillé et moi de L'aller voir pour
nous engager de L'operer, L'ayant Examiné
Nous trouuames que Louverture quil auoit
fait. seruoit d'anus par ou Lécoulement des
matieres Stercorales passoit, et L'anus ne faisoit
nulle fonction, Son état de foiblesse et Le marasme



Dans Lequel il étoit nous força a ne rien entreprendre
et il mourut quelques jours après.

Cette dernière observation Conclut Sensiblement
En faveur des grandes ouvertures dans Certains
abcès du fondement, C'est à dire Lors que Les
Circunstances sont favorables pour Les faire,
Comme étoit Le malade dont je viens de faire
mention dans Le premier temps quil Cet opéré,
et Lou vient de voir Le progrès que La maladie
a fait faite de n'avoir pas découvert suffisamment
Le foyer de Labcès, ou Lon peut conjecturer avec
quelque vraisemblance, que Le Séjour de La
matière purulente de plus en plus altérée
L'intestin, et que La matière a reflue sur La
poitrine. Et a abrégé Les jours du malade

Bertholin

no 35.